



Impfungen für Pferde



Die 3 Core-Impfungen

Krankheit	Grundimmunisierung	Auffrischung
Tetanus	zweimalige Impfung im Abstand von 4-6 Wochen (plus eine Wiederholungsimpfung bei Verabreichung von „Equilis Te“ spätestens bis zum 17. Monat)	alle 2-3 Jahre (Schnelltest für Antikörperspiegel ist vorher möglich)
Equine Influenza	sehr unterschiedlich je nach Impfstoff-Hersteller	halbjährliche bis jährliche Boosterimpfung *
Equiner Herpes (EHV-1 und EHV-4)	2-3 Impfungen im Abstand von 4 Wochen, bis zu 4 Monaten	halbjährlich *

Weitere Impfungen

Tollwut	mit einer oder zwei Impfungen	jährlich
West-Nil-Fieber	zweimalige Impfung im Abstand von 3-6 Wochen	jährlich
Druse	nur für akut infektionsgefährdete Pferde – als Vorsorge nicht empfohlen, da Impfschutz nur wenige Monate besteht	keine
Dermatomykosen	zwei Impfungen im 14-tägigen Abstand Impfschutz besteht 9 Monate (Herstellerangabe)	keine
Equine Rotavirus-Infektion	für tragende Stuten im 8., 9. und 10. Monat jeder Trächtigkeit	keine
Equine vir. Arteritis	zweimalige Impfung im Abstand von 3-6 Wochen ab dem 9. Lebensmonat	halbjährlich
Borreliose	zwei Impfungen im Abstand von 2-3 Wochen	jährlich (im Frühjahr vor Zeckensaison)

* Beachte, dass tragende Stuten andere Impfzyklen haben. Erfrage diese bitte bei deinem Tierarzt.
Merke: Die Grundimmunisierung kann von Hersteller zu Hersteller in Bezug auf den Impfabstand unterschiedlich sein.